

آزمون اعتبار برای منطق ربط KR

*اسدالله فلاحی

چکیده

در منطق سینوی، «شرطی مستصل لزومی» مهم‌ترین قسم از اقسام شرطی به شمار می‌آید. نزدیک‌ترین ادات شرطی به شرطی لزومی، در منطق جدید، «استلزم ربطی» است. بخشی از منطق جدید که به «استلزم ربطی» می‌پردازد، «منطق ربط» نام دارد. میان منطق‌دانان ربط، تزاعی هست که آیا پذیرش یک تناقض، مستلزم هرگزاره دلخواهی است؟ به دیگر سخن، آیا یک گزاره متناقض با هرگزاره دلخواهی مرتبط است؟ پاسخ مثبت به این سؤال، به منطقی به نام KR و پاسخ منفی به آن به منطقی به نام R می‌انجامد. منطق KR، نسبت به منطق R، سماتیک ساده‌تر و شهودی‌تری دارد. با این حال، تعیین اعتبار و عدم اعتبار استدلال‌ها در نظام‌ها و سماتیک‌های گوناگون منطق ربط (حتی در KR) کاری دشوار است که در ادبیات منطق ربط، کمتر به آن پرداخته شده است. در این مقاله، با الهام از یک روش ارزش‌دهی به نام «آزمون اعتبار» که هیوز و کرسول در منطق موجّهات معرفی کرده‌اند، یک «آزمون اعتبار» برای منطق KR طراحی کرده و کاربرد آن را در چند مثال نشان داده‌ایم.

کلیدواژه‌ها: شرطی لزومی، منطق ربط، R، KR، آزمون اعتبار.

مقدمه

در منطق‌های قدیم و جدید، ادات شرطی به گونه‌های مختلف تقسیم شده‌اند. برای نمونه، در منطق سینوی، شرطی متصل به دو نوع «لزومی» و «اتفاقی» تقسیم می‌گردد؛ متصل اتفاقی نیز خود به دو قسم «اتفاقی خاص» و «اتفاقی عام» تفسیر می‌شود.^(۱) این در حالی است که در منطق جدید، اقسام زیر برای ادات شرطی شناسایی شده است: «استلزم مادی»، «استلزم اکید»، «استلزم ربطی»، «استلزم استنتاجی»، «استلزم شهودی»، «شرطی خلاف واقع»، و...^(۲)

تطبیق اقسام شرطی در منطق سینوی با اقسام شرطی در منطق جدید کار چندان ساده‌ای نیست و به آگاهی دقیق از ویژگی‌های هریک از اقسام شرطی در هریک از این دو منطق نیازمند است.^(۳) از میان شرطی‌های منطق سینوی، بی‌گمان، «متصل لزومی» اهمیت بیشتری دارد. متصل لزومی، غیر از استلزم مادی، با شرطی‌های دیگر در منطق جدید قابل تطبیق است؛ از این‌رو، با شناخت دقیق هریک از این شرطی‌ها، امکان مقایسه و تطبیق آنها با متصل لزومی فراهم می‌آید. در این مقاله، از میان شرطی‌های گوناگونی که در منطق جدید معروفی شده است، تنها به «استلزم ربطی» و دو تفسیر مهم از آن می‌پردازیم.

مجموعه نظام‌های منطقی که تفسیرهای گوناگون از «استلزم ربطی» را صورت‌بندی می‌کنند، با عنوان کلی «منطق ربط»^(۴) یا «منطق ربطی»^(۵) شناخته می‌شوند.^(۶) این نظام‌ها بسیارند و مهم‌ترین آنها منطق R است که سایر نظام‌ها در ارتباط با آن و در سایه آن شناخته می‌شوند. نام این نظام‌ها در منطق ربط فرعی بودن آنها را نسبت به منطق R به خوبی نشان می‌دهد: CR، KR، RM₃، RM، PWR، R⁺، R[□]، R_{fde}، R → و...^(۷). در این مقاله، تنها به نظام KR می‌پردازیم و با بیان تفاوت اصلی آن با منطق ربط R، روشهای تعیین اعتبار و عدم اعتبار استدلال‌ها در KR طراحی می‌کنیم.

آزمون اعتبار

روش‌های تعیین اعتبار و عدم اعتبار را «آزمون اعتبار» یا «اعتبارسنجی»^(۸) می‌نامند. برای منطق گزاره‌ها و منطق محمول‌ها، روشن‌های گوناگونی به منظور اعتبارسنجی طرّاحی شده است که شناخته شده‌ترین آنها عبارت‌اند از:^(۹) استفاده از جداول‌های ارزش،^(۱۰) روشن‌های نموداری،^(۱۱) صورت نرمال،^(۱۲) و ارزش‌دهی.^(۱۳) از میان روشن‌های گوناگون برای «آزمون اعتبار»، روشن ارزش‌دهی سریع‌ترین و ساده‌ترین روش است. لطف‌الله نبوی صورت بسیار ساده‌ای از این روش را برای منطق جمله‌های کلاسیک در کتاب مبانی منطق جدید آورده است.^(۱۴) جی. ای. هیوز و ماکس کرسویل روشن ارزش‌دهی را با کامیابی به منطق موجّهات گسترش داده و آن را معرفی کرده‌اند.^(۱۵) نگارنده نیز در پایان نامهٔ کارشناسی ارشد خود، معرفی این روشن را به فارسی برگردانده است.^(۱۶)

از آنجا که تا زمان نگارش این مقاله نتوانستیم روشن ارزش‌دهی را در ادبیات منطق ربط بیاییم، تلاش کرده‌ایم تا روشن هیوز و کرسویل را به منطق ربط گسترش دهیم. این کار اصولاً باید در مورد منطق ربط R انجام گیرد؛ اما گسترش روشن ارزش‌دهی به این منطق پیچیدگی‌هایی دارد که پرداختن به آن را دشوار می‌سازد. این در حالی است که تعمیم روشن هیوز و کرسویل به منطق ربط KR (که در مقدمه معرفی کردیم) بسیار آسان‌تر است. به همین سبب، در این مقاله، فقط از طرّاحی روشن ارزش‌دهی برای منطق KR سخن می‌گوییم و گسترش آن به منطق R را در مقالهٔ دیگری بررسی می‌کنیم. در ادامه، نخست، معرفی کوتاهی از نظام اصل موضوعی برای منطق ربط KR و سماتیک آن به دست می‌دهیم؛ سپس، به آزمون اعتباری که برای آن طرّاحی کرده‌ایم، می‌پردازیم.

منطق ربط KR

منطق KR از افزودن اصل موضوع «از تناقض»، $B \rightarrow (A \wedge \neg A)$ یا شکل قاعده‌ای آن به

منطق R به دست می‌آید:

$$\frac{A \wedge \sim A}{\text{از تناقض (EFQ) }} \quad B$$

درباره اصل موضوع و قاعدة «از تناقض» سخن خواهیم گفت؛ اماً پیش از آن، باید منطق R را معرفی کنیم. نبود در کتاب مبانی منطق فلسفی نظام اصل موضوعی و دستگاه استنتاج طبیعی برای منطق R را به تفصیل معرفی کرده است.^(۱۷) ما در اینجا، برای اختصار، تنها نظام اصل موضوعی منطق R را معرفی می‌کنیم:

قواعد منطق R

MP	$\vdash A \rightarrow B, \vdash A \Rightarrow \vdash B$	قاعدة وضع مقدم
Ad	$\vdash A, \vdash B \Rightarrow \vdash A \wedge B$	قاعدة پیوند

اصول موضوعی منطق R:

I	$A \rightarrow A$	همانی
C*	$A \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow B)$	اظهار
B'	$(A \rightarrow B) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C))$	تعذری (پیسوند)
W	$(A \rightarrow (A \rightarrow B)) \rightarrow (A \rightarrow B)$	انقباض
$\wedge E$	$(A \wedge B) \rightarrow A$ $(A \wedge B) \rightarrow B$	حذف عاطف
$\wedge I$	$[(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow C)] \rightarrow [A \rightarrow (B \wedge C)]$	معرفی عاطف
$\vee E$	$[(A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C)] \rightarrow [(A \vee B) \rightarrow C]$	حذف فاصل
$\vee I$	$A \rightarrow (A \vee B)$ $B \rightarrow (A \vee B)$	معرفی فاصل
Dis	$(A \wedge (B \vee C)) \rightarrow ((A \wedge B) \vee C)$	پخش ضعیف
DNE	$\sim \sim A \rightarrow A$	حذف نقض مضاعف
DNI	$A \rightarrow \sim \sim A$	معرفی نقض مضاعف
CON	$(A \rightarrow B) \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim A)$	عكس نقیض

۴۳ □ KR آزمون اعتبار برای منطق ربط

چنان‌که گفتیم، افزودن اصل موضوع «از تناقض» (EFQ) به منطق R ما را به منطق می‌رساند:

EFQ	از تناقض \rightarrow $(A \wedge \neg A)$
-----	--------------------------------------------

اصل یا قاعدة «از تناقض» می‌گوید: از هر تناقض، می‌توان گزاره دلخواه را نتیجه گرفت. این ادعا با شهودهای ما سازگار نیست؛ از این‌رو، منطق دانان ربط از پذیرش آن سر باز زده‌اند. اماً انکار این اصل سبب شده است که در منطق ربط R، یک اصل و قاعدة بسیار شهودی به نام «قیاس انفصلی» از دست برود:

$$\frac{\begin{array}{c} A \vee B \\ \neg A \\ \hline \text{قاعدة «قیاس انفصلی»} \end{array}}{B} \quad \text{اصل «قیاس انفصلی»} \quad [(A \vee B) \wedge \neg A] \rightarrow B$$

همین مسئله موجب شده است که مخالفان منطق ربط انتقادات بسیاری را به منطق R وارد سازند.^(۱۸) منطق دانان ربط پاسخ‌های بسیاری به این ایرادها داده‌اند.^(۱۹) یکی از این پاسخ‌ها می‌تواند این باشد که اصل یا قاعدة «قیاس انفصلی» را به منطق R بیفزاییم. افزودن این قاعدة سبب می‌شود اصل یا قاعدة «از تناقض» اثبات شود و منطق R به دست آید. بنابراین، منطق KR می‌تواند پاسخی باشد به انتقادات سهمگینی که به نامعتبر بودن قیاس انفصلی در منطق R وارد شده است. درباره نقاط قوت و ضعف این پاسخ می‌توان سخن گفت؛ اماً در این مقاله، ترجیح می‌دهیم تنها به یکی از نقاط قوت آن اشاره کنیم: منطق KR، سماتیک ساده‌تر و شهودی‌تری نسبت به منطق R دارد و آزمون اعتبار ما برای آن آسان‌تر از آزمون اعتبار منطق R است.

KR منطق سماتیک

سماتیک منطق ربط صورت‌بندی‌های گوناگون دارد که در اینجا، صورت‌بندی گریم پریست و ریچارد سیلوان را ارائه می‌کنیم که ساده‌ترین صورت‌بندی از سماتیک منطق ربط است. در این صورت‌بندی، که در سال ۱۹۹۲ به دست داده شده،^(۲۰) «ساختار»

□ ۴۴ مرف فلسفی سال نهم، شماره اول، پاییز ۱۳۹۰

سه‌تایی مرتب $\langle W, g, R, V \rangle$ و «مدل» چهارتایی مرتب $\langle W, g, R, V \rangle$ است:

$$F = \langle W, g, R \rangle$$

$$M = \langle W, g, R, V \rangle$$

F ساختاری است که از W , g و R ساخته می‌شود: W مجموعه جهان‌های ممکن (نرمال و غیرنرمال) است، g «تنها جهان نرمال» می‌باشد و R یک رابطه دسترس پذیری «سه‌موقعی» روی مدل یا الگوست که از افزودن تابع ارزش‌دهی V به ساختار، به دست می‌آید.

در این سmantیک، شرایط صدق ادات‌های «ناقض»، «عاطف»، و «فاصل»، و سورهای کلی و جزئی به صورت کلاسیک باقی می‌ماند؛ اماً شرط صدق «استلزم ربطی» به صورت زیر تغییر می‌کند:

شرایط صدق شرطی در سmantیک منطق KR

$\models_g (A \rightarrow B)$	اما	$\forall x (\models_x A \supset \models_x B)$	در جهان نرمال : g
$\models_w (A \rightarrow B)$	اما	$\forall x \forall y [Rwxy \supset (\models_x A \supset \models_y B)]$	در جهان غیرنرمال : w

چنان‌که دیده می‌شود، شرط صدق «استلزم ربطی» در جهان نرمال g ، دقیقاً شبیه شرط صدق «استلزم اکید» در جهان‌های سmantیک منطق S5 است. (۲۱)

سمantیک KR، شرایط ساختار بسیار شبیه شرایط ساختار در سmantیک S5 است:

شرایط ساختار در سmantیک منطق KR

این‌همانی $(a=b)$	شرط g
بازتابی	Raaa
جابه‌جایی	Rabc=Rbac=Racb
شرکت پذیری	R(ab)cd=Ra(bc)d

برای درک مفهوم شرط «تعددی»، به دو تعریف نخست از سه تعریف زیر نیاز داریم:

$$R(ab)cd = \exists x(Rabx \wedge Rxcd)$$

$$Ra(bc)d = \exists x(Rbcx \wedge Raxd)$$

$$Rab(cd) = \exists x(Rcdx \wedge Rabx)$$

تعریف سوم در ادبیات منطق ربط نیامده است و عملاً هم مورد نیاز نخواهد بود؛ اما سنجش آن با دو تعریف نخست، برای درک آن دو تعریف، سودمند است. با دو تعریف نخست، شرط تعدی به صورت زیر در می‌آید:

$$\exists x(Rabx \wedge Rxcd) = \exists x(Rbcx \wedge Raxd)$$

چنان‌که دیده می‌شود، شرط «تعدی» برای رابطه سه‌موضعی نسبت به رابطه دو‌موضعی بسیار پیچیده‌تر است. نام‌های «جابه‌جایی» و «شرکت‌پذیری» برای دو شرط «تقارن» و «تعدی» کاملاً مفهوم هستند؛ اما نام «تعدی» مبهم به نظر می‌رسد. (۲۲)

مفهوم رابطه دسترسي

اکنون که با شرایط رابطه دستری و شرط صدق ادات شرطی آشنا شدیم، می‌توانیم مفهوم فلسفی رابطه دستری و عبارت‌هایی مانند $Rabc$ و $R(ab)cd$ را بهتر شرح دهیم.

مفهوم رابطه دستری سه‌موضعی


عبارت $Rabc$ می‌گوید: جهان a ، از طریق جهان b ، به جهان c دستری دارد؛ ساده‌تر اینکه: a ، از طریق b ، c را می‌بیند. (۲۳) این عبارت، از دیدگاه فلسفی، به این معناست که جهان a به کمک جهان b ، به صورت ربطی، جهان c را نتیجه می‌دهد.

اما نتیجه‌گیری میان جمله‌ها و گزاره‌ها معنا می‌دهد و نه میان جهان‌ها؛ اینکه جهانی، جهان دیگری را نتیجه بدهد به چه معناست؟ پاسخ این است که مقصود از استنتاج میان جهان‌ها، استنتاج میان گزاره‌های شرطی و مقدم آنها در آن جهان‌هاست. با این بیان، معنای اینکه جهان a به کمک b جهان c را نتیجه می‌دهد دقیقاً این است که اگر گزاره


□ ۴۶ مرفت فلسفی سال نهم، شماره اول، پاییز ۱۳۹۰

شرطی $P \rightarrow Q$ در جهان a و گزاره P در جهان b صادق باشد، Q در جهان c صادق است.
 (این مفهوم را می‌توان به صورت ساده‌تر چنین کوتاه کرد: وضع مقدم جهان a بر جهان b،
 جهان c را نتیجه می‌دهد.)


یکی از دشواری‌ها در فهم رابطه دسترس پذیری R، نشان دادن تصویری و نموداری آن است. چگونه می‌توان رابطه $Rabc$ را نشان داد؟ در سماتیک منطق‌های وجهی، رابطه دوموضعی Rab را به سادگی، با نمودار زیر، نشان می‌دهند:



در سماتیک منطق S5، این رابطه را به صورت دوسویه نیز می‌توان نشان داد:



رابطه سه‌موضعی $Rabc$ در منطق KR، به دلیل اینکه سه‌موضعی و متقارن است، باید به صورت مثلثی و با فلش دوسویه در هر ضلع آن نشان داده شود:



اما از آنجا که ترسیم نمودار بالا کم‌وپیش دشوار است، نمودار نامتقارن ولی ساده‌تر زیر را برمی‌گزینیم:




مفهوم رابطه دسترسی چهارموضعی

مفهوم عبارت $R(ab)cd$ اندکی پیچیده‌تر است. این عبارت می‌گوید: جهان a، از طریق جهان b، به جهان c ای دسترسی دارد که آن جهان « از طریق جهان d، به جهان


۴۷ □ KR آزمون اعتبار برای منطق ربط

دسترسی دارد. نمودار این رابطه چهارموضعی به صورت نزولی زیر است:



این نمودار را چنین می خوانیم: a، b، c از طریق x، d را نتیجه می دهد که آن x از طریق c، d را نتیجه می دهد. معنای این نمودار آن است که اگر گزاره های شرطی $P \rightarrow Q$ و $R \rightarrow S$ ، به ترتیب، در دو جهان a و b صادق باشند، Q در جهان x صادق است. حال اگر خود $Q \rightarrow R$ باشد، این گزاره شرطی در جهان x صادق است؛ حال اگر $S \rightarrow R$ صادق باشد، S در d صادق خواهد بود. بنابراین، عبارت $R(ab)cd$ بدین معناست که اگر گزاره های شرطی $(R \rightarrow S)$ ، $P \rightarrow R$ ، به ترتیب، در سه جهان a، b و c صادق باشند، S در جهان d صادق است. (این مفهوم را می توان به صورت ساده تر چنین کوتاه کرد: وضع مقدم جهان a بر دو جهان b و c، جهان d را نتیجه می دهد.)

مفهوم عبارت $Ra(bc)d$ از این هم پیچیده تر است. این عبارت، بنا به تعریف، می گوید: جهان b، از طریق جهان c، به جهان x ای دسترسی دارد که جهان a از طریق آن جهان x به جهان d دسترسی دارد. نمودار این رابطه چهارموضعی به صورت صعودی زیر است:



۴۸ مرفت فلسفی سال نهم، شماره اول، پاییز ۱۳۹۰


این نمودار را چنین می‌خوانیم: a, b از طریق c, x را نتیجه می‌دهد که a از طریق آن d, x را نتیجه می‌دهد. معنای این نمودار آن است که اگر گزاره‌های شرطی $P \rightarrow Q$ و P ، به ترتیب، در دو جهان b و c صادق باشند، Q در جهان x صادق است. حال اگر یک گزاره شرطی $R \rightarrow Q$ در جهان a صادق باشد، با وضع مقدم b در x نتیجه می‌دهد که R در d صادق است. بنابراین، عبارت $Ra(bc)d$ بدین معناست که اگر دو گزاره شرطی $R \rightarrow Q$ و گزاره $P \rightarrow R$ ، به ترتیب، در سه جهان a, b و c صادق باشند، R در جهان d صادق است. (این مفهوم را می‌توان به صورت ساده‌تر چنین کوتاه کرد: قیاس شرطی جهان b بر جهان a ، جهانی را نتیجه می‌دهد که وضع مقدم آن بر جهان c ، جهان d را نتیجه می‌دهد.)

اکنون که مفهوم R ‌های چهارموضعی را شرح دادیم و نمودارهای آنها را ترسیم کردیم، می‌توانیم R ‌های با موضع‌های بیشتر را به دلخواه تعریف کنیم. برای نمونه، دو تعریف از انواع R پنجموضعی را در زیر می‌آوریم:


$$R(ab)(cd)e = \exists x [Rabx \wedge Rx(cd)e] = \exists x \exists y (Rabx \wedge Rcdy \wedge Rxye)$$

$$R((ab)c)de = \exists x [Rabx \wedge R(xc)de] = \exists x \exists y (Rabx \wedge Ryde \wedge Rxcy)$$

نمودار اینها به صورت زیر است:



$R(ab)(cd)e$



$R((ab)c)de$

در این دو نمودار، جهان‌های x و y را «جهان‌های وسط»، و جهان‌های a, b, c, d و e را «جهان‌های طرف» می‌نامیم. با ادامه این روش، می‌توان رابطه دسترسی n رموضعی را

۴۹ □ KR آزمون اعتبار برای منطق ربط

تعریف کرد:

$$Ra_1a_2...a_n = \exists x [Ra_1a_2x \& Ra_2a_3...a_n] = R(...((a_1a_2)a_3)...a_n a_{n-1})$$

تعریف اعتبار

«صدق» و «اعتبار» دو مفهوم سmantیکی اند که گاه به جای یکدیگر به کار می‌روند؛ اما بسیاری از منطق‌دانان این دو مفهوم را از هم جدا می‌کنند و صدق را تنها در جهان‌های ممکن، و اعتبار را تنها در مدل‌ها و ساختارها به کار می‌برند. صدق در جهان‌های ممکن برای جمله‌نشانه‌ها و جمله‌های مرکب متفاوت است: صدق جمله‌نشانه‌ها از طریق تابع ارزش‌دهی تعیین می‌شود و در یک معنا قراردادی است؛ اماً صدق فرمول‌های مرکب بر اساس شرایط صدق ادات‌های تعیین می‌شود و قراردادی نیست. اعتبار نیز در مدل و ساختار متفاوت است: اعتبار در مدل چندین معنا دارد؛ اماً اعتبار در ساختار تنها دارای یک معناست. اعتبار در ساختار همواره به معنای اعتبار در همه مدل‌های آن است؛ اماً اعتبار در مدل به چه معناست؟

«اعتبار در مدل» در سmantیک KR برای فرمول‌های شرطی و غیرشرطی، و قاعده‌های یک، دو، سه و چندمقدمه‌ای متفاوت است:

«اعتبار در مدل» در سmantیک منطق KR

$\models A$	$\equiv_g \models_g A$	اعتبار فرمول غیرشرطی:
$\models (A \rightarrow B)$	$\equiv_g \forall x (\models_x A \supset \models_x B)$	اعتبار فرمول شرطی:
$A \models B$	$\equiv_g \forall x (\models_x A \supset \models_x B)$	اعتبار قاعدة تک‌مقدمه‌ای:
$A, B \models C$	$\equiv_g \forall x \forall y \forall z [(Rxyz \& \models_x A \& \models_y B) \supset \models_z C]$	اعتبار قاعدة دو‌مقدمه‌ای:
$A, B, C \models D$	$\equiv_g \forall x \forall y \forall z \forall w [(R(xy)zw \& \models_x A \& \models_y B \& \models_z C) \supset \models_w D]$	اعتبار قاعدة سه‌مقدمه‌ای:

اعتبار قاعده‌های چهارمقدمه‌ای و بالاتر را نیز می‌توان نوشت؛ اماً به کمک تعریف R^n موضعی ارائه تعریفی کلّی از آن امکان‌پذیر است. البته از آنجاکه ما در عمل با قاعده‌های

چهار مقدمه‌ای و بالاتر سروکار نخواهیم داشت، از تعریف آن خودداری می‌کنیم. نکته‌ای که توجه به آن ضرورت دارد این است که ادات‌های شرطی در تعریف اعتبار همگی «استلزم مادی» هستند و قوانین منطق کلاسیک برای آنها جاری است. توجه به این نکته در کار با این سماتیک راهگشا خواهد بود.

آزمون اعتبار

در این بخش، برای اعتبارسنجی فرمول‌ها و صورت‌برهان‌ها در سماتیک منطق KR، روشی را ارائه می‌کنیم که برگرفته از هیوز و کرسول است.^(۲۴) بنیان این روش بر برهان خلف استوار است؛ به این معنا که ما همواره عدم اعتبار فرمول یا صورت‌برهان مورد نظر را فرض می‌گیریم و تلاش می‌کنیم به تناقض برسیم. اگر در رسیدن به تناقض کامیاب بودیم، نادرستی فرض را نشان داده و اعتبار را نتیجه می‌گیریم؛ اماً اگر توانیم به تناقض برسیم، تلاش می‌کنیم یک مدل نقض برای فرمول یا صورت‌برهان مورد آزمون بیاییم. اگر چنین مدلی را یافتیم، عدم اعتبار را نتیجه می‌گیریم؛ اماً اگر چنین مدلی یافت نشد، دیگر نمی‌توان اعتبار یا عدم اعتبار را نتیجه گرفت.

آزمون اعتبار در منطق کلاسیک جمله‌ها

آزمون اعتبار در منطق کلاسیک به این صورت است که برای برهان خلف، به ادات اصلی مقدمه‌ها ارزش 1° و به ادات اصلی نتیجه‌ها ارزش 0° می‌دهیم و به کمک شرایط صدق، تلاش می‌کنیم تا ارزش ادات فرعی و جمله‌نشانه‌ها را به دست آوریم. (برای آزمون فرمول‌ها، به ادات اصلی آنها ارزش 0° می‌دهیم). در اینجا، مثالی ذکر می‌کنیم که نبی در کتاب خود شرح داده است؛^(۲۵) برآئیم تا اعتبار صورت‌برهان زیر را در منطق کلاسیک بستجیم:

$$P \supset Q , R \supset S , P \vee S \vdash Q \vee R$$

آزمون اعتبار برای منطق ربط KR □ ۵۱

در آغاز، مقدمه‌ها را صادق فرض می‌کنیم و نتیجه را کاذب می‌گیریم:

$$\begin{array}{cccc} P \supset Q & , & R \supset S & , \\ 1 & & 1 & \\ P \vee S & \vdash & Q \vee R & \\ 1 & & 0 & \end{array}$$

بنا به جدول ارزش فاصل، کذب نتیجه مستلزم کذب طرفین آن (Q و R) است.

بنابراین، ارزش ۰ را برای همه موارد Q و R وارد می‌کنیم:

$$\begin{array}{cccc} P \supset Q & , & R \supset S & , \\ 1 \ 0 & & 0 \ 1 & \\ P \vee S & \vdash & Q \vee R & \\ 0 \ 1 & & 1 \ 0 & \\ & & 0 \ 0 & \end{array}$$

اماً صدق ترکیب شرطی (مادّی) در مقدمه نخست و کذب تالی آن، بنا به جدول ارزش استلزم کذب مقدم آن (P) است. بنابراین، ارزش ۰ را برای همه موارد P وارد می‌کنیم:

$$\begin{array}{cccc} P \supset Q & , & R \supset S & , \\ 0 \ 1 \ 0 & & 0 \ 1 & \\ P \vee S & \vdash & Q \vee R & \\ 0 \ 1 & & 0 \ 0 & \\ & & 0 \ 0 & \end{array}$$

اماً صدق ترکیب فصلی در مقدمه سوم و کذب مقدم آن، بنا به جدول ارزش فاصل، مستلزم صدق تالی آن (S) است. بنابراین، ارزش ۱ را برای همه موارد S وارد می‌کنیم:

$$\begin{array}{cccc} P \supset Q & , & R \supset S & , \\ 0 \ 1 \ 0 & & 0 \ 1 \ 1 & \\ P \vee S & \vdash & Q \vee R & \\ 0 \ 1 & & 0 \ 1 \ 1 & \\ & & 0 \ 0 & \end{array}$$

می‌بینیم که با این ارزش‌گذاری‌ها، همه ادات‌ها و جمله‌نشانه‌ها ارزش‌دهی شدند؛ بدون اینکه تناقضی پیدید آید. این امر نشان می‌دهد که فرض نخستین، یعنی فرض صدق مقدمه‌ها و کذب نتیجه، مستلزم هیچ تناقضی نیست و ممکن است مقدمه‌ها صادق و نتیجه کاذب باشند؛ بنابراین، صورت برهان بالا نامعتبر است. در صورت عدم اعتبار، می‌توان مثال نقض یا مدل نقض ارائه کرد. برای این کار، ارزش جمله‌نشانه‌ها را از آزمون به پایان رسیده گردhem آورده و جداگانه می‌نویسیم:

$$\begin{array}{cccc} P & Q & R & S \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

این مدل نقض، سطیری از جدول ارزش را نشان می‌دهد که در آن، مقدمه‌های صورت برهان بالا صادق‌اند و نتیجه آن کاذب است.

اکنون، برای صورت برهان معتبر در منطق کلاسیک، مثالی می‌آوریم و آن را می‌آزماییم:

$$P \supset Q , R \supset S , P \vee R \vdash Q \vee S$$

در آغاز، مقدمه‌ها را صادق فرض می‌کنیم و نتیجه را کاذب می‌گیریم:

$$\begin{array}{cccc} P \supset Q & , & R \supset S & , \\ 1 & & 1 & \\ P \vee R & \vdash & Q \vee S & \\ 1 & & 0 & \end{array}$$

بنابراین جدول ارزش فاصل، کذب نتیجه مستلزم کذب طرفین آن (Q و S) است.

بنابراین، ارزش '۰' را برای این دو متغیر وارد می‌کنیم:

$$\begin{array}{cccc} P \supset Q & , & R \supset S & , \\ 1\ 0 & & 1\ 0 & \\ P \vee R & \vdash & Q \vee S & \\ & & 0\ 0\ 0 & \end{array}$$

اماً صدق ترکیب شرطی (مادّی) در دو مقدمه نخست و کذب تالی آنها، بنا به جدول ارزش استلزم مادّی، مستلزم کذب مقدم آنها (P و R) است. بنابراین، ارزش '۰' برای P و R وارد می‌کنیم:

$$\begin{array}{cccc} P \supset Q & , & R \supset S & , \\ 0\ 1\ 0 & & 0\ 1\ 0 & \\ P \vee R & \vdash & Q \vee S & \\ 0\ 1\ 0 & & \underline{0\ 1\ 0} & \\ & & & 0\ 0\ 0 \end{array}$$

اماً صدق ترکیب فصلی در مقدمه سوم و کذب مقدم و تالی آن، بنا به جدول ارزش فاصل، ممکن نیست و این تناقض است. این تناقض را به این صورت می‌توان آشکارتر ساخت که بگوییم کذب مقدم و تالی ترکیب فصلی در مقدمه سوم مستلزم کذب آن ترکیب فصلی است:

$$\begin{array}{cccc} P \supset Q & , & R \supset S & , \\ 0\ 1\ 0 & & 0\ 1\ 0 & \\ P \vee R & \vdash & Q \vee S & \\ 0\ 1\ 0 & & \underline{0\ 0\ 1\ 0} & \\ & & & 0\ 0\ 0 \end{array}$$

می‌بینیم که با این ارزش‌گذاری‌ها، به تناقض می‌رسیم. این امر نشان می‌دهد که فرض نخستین، یعنی فرض صدق مقدمه‌ها و کذب نتیجه، باطل است؛ ممکن نیست مقدمه‌ها صادق باشند و نتیجه کاذب باشد. بنابراین، صورت برهان بالا معتبر است. (۲۶)

قاعده‌های آزمون برای KR

قاعده‌های آزمون اعتبار را برای منطق کلاسیک، به کوتاهی، بیان کردیم. همه این قاعده‌ها برای منطق KR نیز برقرارند، مگر در مورد قاعده‌های دو یا چند مقدمه‌ای. از آنجاکه شرطی ربطی و قاعده‌های دو یا چند مقدمه‌ای در منطق KR شرایط صدق و

آزمون اعتبار برای منطق ربط KR ۵۳

تعریف اعتبار دیگری دارند، آزمون اعتبار برای این دو منطق از این دو جهت متحمایز می‌شود. شرایط صدق ادات شرطی ربطی و تعریف اعتبار برای قاعده‌های دومقدمه‌ای را قبل‌آوردهای؛ بنابراین، تنها لازم است قاعده‌های آزمون برای شرطی ربطی را بیان کنیم. اما اینک، برای یادآوری، همه را تکرار می‌کنیم:

شرایط صدق شرطی در سmantیک منطق KR

$\models_g (A \rightarrow B)$	اتا	$\forall x (\models_x A \supset \models_x B)$	در جهان نرمال g :
$\models_w (A \rightarrow B)$	اتا	$\forall x \forall y [Rwxy \supset (\models_x A \supset \models_y B)]$	در جهان غیرنرمال w :

بنا به شرایط صدق ادات شرطی، می‌توان شرایط کذب آن را نیز به دست آورد:

«شرایط کذب» شرطی

$\#_g (A \rightarrow B)$	اتا	$\exists x (\models_x A \& \#_x B)$	کذب در جهان نرمال g :
$\#_w (A \rightarrow B)$	اتا	$\exists x \exists y (Rwxy \& \models_x A \& \#_y B)$	کذب در جهان غیرنرمال w :

«اعتبار در مدل» در سmantیک منطق KR

$\models A$	= ع	$\models_g A$	اعتبار فرمول غیرشرطی:
$\models (A \rightarrow B)$	= ع	$\forall x (\models_x A \supset \models_x B)$	اعتبار فرمول شرطی:
$A \models B$	= ع	$\forall x (\models_x A \supset \models_x B)$	اعتبار قاعده تکمقدمه‌ای:
$A, B \models C$	= ع	$\forall x \forall y \forall z [(Rxyz \& \models_x A \& \models_y B) \supset \models_z C]$	اعتبار قاعده دومقدمه‌ای:

چنان‌که دیده می‌شود، اعتبار برای فرمول‌های شرطی و قاعده‌های تکمقدمه‌ای یکسان است.

۵۴ مرفت فلسفی سال نهم، شماره اول، پاییز ۱۳۹۰

از «شرایط صدق و کذب» شرطی ربطی، می‌توان قاعده‌هایی برای «آزمون اعتبار» شرطی به دست آورد.

«آزمون اعتبار» برای ادات شرطی ربطی

→ در جهان نرمال g:
۱. اگر کاذب باشد: ا. یک و فقط یک جهان جدید می‌سازیم و ب. در آن جهان، به A ارزش '1' و به B ارزش '0' می‌دهیم؛ ۲. اما اگر صادق باشد: ا. جهان جدید نفعی سازیم؛ بلکه ب. در هر جهانی که A ارزش '1' دارد به B نیز ارزش '1' می‌دهیم؛ و ج. در هر جهانی که B ارزش '0' دارد به A نیز ارزش '0' می‌دهیم.
→ در جهان غیرنرمال w:
۳. اگر کاذب باشد: ا. دو و فقط دو جهان جدید مانند x و y می‌سازیم؛ ب. رابطه $Rwxy$ را برقرار می‌سازیم؛ ج. به A در x ارزش '1' و به B در y ارزش '0' می‌دهیم؛ ۴. اما اگر صادق باشد: ا. جهان جدید نفعی سازیم؛ بلکه در هر دو جهانی مانند x و y که رابطه $Rwxy$ برقرار است: ب. اگر A در x ارزش '1' داشته باشد به B در y نیز ارزش '1' می‌دهیم؛ ج. اگر B در y ارزش '0' داشته باشد به A در x نیز ارزش '0' می‌دهیم.

آزمون اعتبار برای چند فرمول و قاعده

اکنون بایسته است آزمونی را که طراحی کرده‌ایم، در چند مثال، به کار بگیریم تا توانمندی‌های آن آشکار گردد:

M3) فرمول ۱

در آغاز، فرمول M_3 را از قضایای کلاسیک در نظر بگیرید:

$$M_3 \ P \vee (P \rightarrow Q)$$

از آنجاکه ادات اصلی این فرمول شرطی ربطی نیست، برای سنجش اعتبار آن، باید

آن را در جهان نرمال g کاذب بگیریم:

g	$P \vee (P \rightarrow Q)$
	O

بنا به جدول ارزش فاصل، داریم:

g	$P \vee (P \rightarrow Q)$
	O
	O
	O

بنا به قاعده آزمون، کذب شرطی در جهان نرمال g یک جهان جدید تولید می‌کند که مقدم شرطی در آن صادق، و تالی شرطی در آن کاذب است:

x	P	Q
	1	O

آشکار است که دو جهان g و x نمی‌توانند یکی باشند؛ زیرا P در x صادق، و در g کاذب است. از اینجا معلوم می‌شود که اگر تنها یک جهان داشتیم، کذب فرمول M_3 ما را به تناقض می‌رساند؛ اما چون دو جهان داریم، به تناقض نمی‌رسیم. نرسیدن به تناقض نشان می‌دهد که فرمول M_3 در منطق KR نامعتبر است؛ اما برای عدم اعتبار باید یک مدل نقض ارائه کنیم. در هر مدل، همه جمله‌نشانه‌ها باید در همه جهان‌ها ارزش گرفته باشند؛ اما ارزش Q در جهان g هنوز به دست نیامده است. از آنجاکه ارزش Q در جهان g تأثیری بر ارزش فرمول در g و در x نمی‌گذارد، می‌توانیم به Q ارزش صدق یا ارزش کذب بدهیم. بر این اساس، دو مدل نقض ارائه می‌کنیم:

□ ۵۶ مرفت فلسفی سال نهم، شماره اول، پاییز ۱۳۹۰

$$M = \langle W, g, R, V \rangle$$

$$W = \{g, x\}$$

$$R = \{ggg, xxx, gxx, xgx, xxg\}$$

$$M = \langle W, g, R, V \rangle$$

$$W = \{g, x\}$$

$$R = \{ggg, xxx, gxx, xgx, xxg\}$$

V	P	Q
g	0	1
x	1	0

V	P	Q
g	0	0
x	1	0

از آنجاکه ارزش سایر جمله‌نشانه‌ها (مانند S ، R و...) در این دو مدل تأثیری ندارد، می‌توانیم همه آنها را در هر دو جهان صادق بگیریم یا همه را در هر دو جهان کاذب بگیریم یا برخی را صادق و برخی را کاذب بگیریم. این امر نشان می‌دهد که برای فرمول M_3 ، نه دو مدل نقض، بلکه بی‌نهایت مدل نقض داریم! در حقیقت، دو مدل بالا، مدل‌های ناقصی هستند که به بی‌نهایت روش می‌توانند تکمیل شوند. ما از نوشتن مدل‌های نقض به صورت کامل همواره پرهیز می‌کنیم.

(۲) پارادوکس انفصال

اکنون به پارادوکس انفصال از قضایای کلاسیک می‌پردازیم:

$$(P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow P)$$

برای سنجش اعتبار این فرمول، باید آن را در جهان نرمال g کاذب بگیریم (زیرا ادات

اصلی آن شرطی ربطی نیست):

g	$(P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow P)$
	O

بنابراین با جدول ارزش فاصل، داریم:

g	$(P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow P)$
	O
	O

بنابراین با قاعده آزمون، کذب شرطی در جهان نرمال g جهان تازه‌ای تولید می‌کند که

آزمون اعتبار برای منطق ربط KR □ ۵۷

مقدّم شرطی در آن صادق، و تالی شرطی در آن کاذب است. اما در اینجا، دو شرطی کاذب داریم؛ بنابراین، دو جهان تازه ساخته می‌شود:

x	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 100%;"> <tr> <td style="width: 30px; height: 20px;"></td><td style="width: 30px; height: 20px;"></td></tr> <tr> <td style="width: 30px; height: 20px;"></td><td style="width: 30px; height: 20px;"></td></tr> </table>				
y	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 100%;"> <tr> <td style="width: 30px; height: 20px;"></td><td style="width: 30px; height: 20px;"></td></tr> <tr> <td style="width: 30px; height: 20px;"></td><td style="width: 30px; height: 20px;"></td></tr> </table>				

آشکار است که دو جهان x و y نمی‌توانند یکی باشند؛ زیرا ارزش P و Q در آنها متعارض است. از اینجا معلوم می‌شود که اگر تنها یک جهان داشتیم، کذب پارادوکس انفصال ما را به تناقض می‌رساند؛ اما چون دستکم دو جهان متمایز داریم، به تناقض نمی‌رسیم. برای عدم اعتبار پارادوکس انفصال باید یک مدل نقض ارائه کنیم. این مدل می‌تواند سه جهان g , x و y را داشته باشد که ارزش P و Q در جهان g دلخواه است. از این‌رو، چهار مدل نقض برای پارادوکس انفصال به دست می‌آید.

از آنجاکه رابطه دسترس پذیری در مدل سه‌جهانی عضوهای بسیاری دارد و نوشتمن آن طولانی می‌شود، مناسب است که بینیم آیا می‌توان مدل بالا را دوچهانی ساخت؟ از آنجاکه ارزش‌های موجود در جهان g تعارضی با ارزش‌های موجود در جهان‌های x و y ندارد، به نظر می‌رسد بتوان یکی از آن دو را با g این‌همان گرفت. ما جهان g را با y این‌همان می‌گیریم و به مدل زیر می‌رسیم:

$$M = \langle W, g, R, V \rangle$$

$$W = \{g, x\}$$

$$R = \{ggg, xxx, gxx, xgx, xxg\}$$

V	P	Q
g	0	1
x	1	0

(۳) قاعدة استلزم

اکنون به قاعدة استلزم از قاعده‌های یک مقدمه‌ای می‌پردازیم:

$$\therefore P \rightarrow Q$$

استلزم _____

$$\therefore \sim P \vee Q$$

ابتدا، جهت بالا به پایین را بررسی می‌کنیم. برای سنجش اعتبار قاعده‌های

یک مقدمه‌ای، باید مقدمه را در یک جهان صادق، و نتیجه را در همان جهان کاذب بگیریم:

	P → Q	¬P ∨ Q
x	1	0

بنا به جدول ارزش فاصل و ناقض، داریم:

	P → Q	¬P ∨ Q
x	1 1 0	0 1 0 0

اماً بنا به شرط انعکاس RXXX را داریم؛ و چون شرطی $P \rightarrow Q$ در x (موقع نخست R) و مقدم آن در x (موقع دوم R) صادق هستند، بنا به «شرط صدق» شرطی در جهان‌های غیرنرمال، Q باید در x (موقع سوم R) صادق باشد:

	P → Q	¬P ∨ Q
x	1 1 10	0 1 0 0

این تناقض نشان می‌دهد که جهت بالا به پایین قاعدة

استلزم معتبر است (زیرا فرض عدم اعتبار آن ما را به تناقض رساند). توجه شود که ما می‌توانستیم رابطه RXXX را به صورت زیر نیز نشان دهیم:

x	P → Q	¬P ∨ Q
x	1	0 1 0 0
	PQ	1 10
x	10	

در این نمودار، چون شرطی و مقدم آن در دو جهان سمت چپ صادق هستند، ناگزیر تالی در جهان سوم (در اینجا، یعنی جهان سمت راست که همان x است) صادق خواهد بود و این مسئله ما را به تناقض می‌رساند. با اینکه ترسیم چنین نموداری چندان دشوار نیست، ترجیح می‌دهیم از نمودار ساده‌تر پیشین استفاده کنیم.

اماً برای سنجش اعتبار جهت پایین به بالای قاعدة «استلزم»، باید مقدمه را در یک جهان صادق، و نتیجه را در همان جهان کاذب بگیریم:

	¬P ∨ Q	P → Q
x	1	0

آزمون اعتبار برای منطق ربط KR ۵۹

بنا به قاعدة «آزمون اعتبار»، کذب شرطی در یک جهان غیرنرمال دو جهان جدید مانند y و z پدید می‌آورد که اولًاً $Rxyz$ برقرار است؛ ثانیاً، مقدم آن شرطی در y صادق، و تالی آن در z کاذب است:

	$\sim P \vee Q$	$P \rightarrow Q$	
x	1	0	
	P		Q
y	1		0

آشکار است که سه جهان x ، y و z نمی‌توانند یکی باشند؛ زیرا در این صورت، ترکیب فصلی دارای دو ارزش متناقض می‌شود. از اینجا معلوم می‌شود که اگر تنها یک جهان داشتیم، نمی‌توانستیم عدم اعتبار قاعدة استلزم (از جهت پایین به بالا) را نشان دهیم. با متمازیگرفتن سه جهان بالا، می‌توانیم یک مدل نقض چهارجهانی (سه جهان موجود در نمودار به همراه جهان نرمال g) برای این قاعدة ارائه کنیم؛ اماّ بهتر است مدل نقض کوچک‌تری بسازیم. برای ارائه مدل نقض دوچهانی، باید یکی از x ، y و z را بگیریم. هر کدام از این سه را که g بگیریم، دو جهان دیگر یکی می‌شوند. ما در اینجا، y را g می‌گیریم و z را در x ادغام، و ارزش فرمول‌ها را بر اساس آن محاسبه می‌کنیم:

g	P	$\sim P \vee Q$	$P \rightarrow Q$
	1	10	100

چون ارزش Q در g نامتعین است و هر ارزشی برای آن در نظر بگیریم ایرادی پیش نمی‌آید، ارزش Q را در آن صادق می‌گیریم و به مدل نقض زیر می‌رسیم:

$$M = \langle W, g, R, V \rangle$$

$$W = \{g, x\}$$

$$R = \{ggg, xxx, gxx, xgx, xxg\}$$

V	P	Q
g	1	1
x	0	0

۴) عکس نقیض

اکنون به قاعدة «عکس نقیض» از قواعد های یک مقدمه ای می‌پردازیم:

۶۰ معرف فلسفی سال نهم، شماره اول، پاییز ۱۳۹۰

$$\therefore P \rightarrow Q$$

عکس نقیض

$$\therefore \sim Q \rightarrow \sim P$$

برای سنجش اعتبار این قاعده، باید مقدمه را در یک جهان صادق، و نتیجه را در

همان جهان کاذب بگیریم:

x	$P \rightarrow Q$	$\sim Q \rightarrow \sim P$
	1	0

بنا به قاعده «آزمون اعتبار»، کذب شرطی در یک جهان غیرنرم‌الدو جهان جدید مانند y و z پدید می‌آورد که اولاً Rxyz برقرار است؛ ثانیاً، مقدم آن شرطی در y صادق، و تالی آن در z کاذب است:

x	$P \rightarrow Q$	$\sim Q \rightarrow \sim P$	z
y	$\sim Q$	0	

اکنون، بنا به جدول ارزش ناقض، ارزش Q در y و ارزش P در z به دست می‌آید:

x	$P \rightarrow Q$	$\sim Q \rightarrow \sim P$	z
y	$\sim Q$	0	

می‌بینیم که یک شرطی ($P \rightarrow Q$) در x صادق، و مقدم آن (P) در z صادق است و

داریم: Rxyz. بنابراین، تالی (Q) در y صادق می‌شود و به تناقض می‌رسیم:

x	$P \rightarrow Q$	$\sim Q \rightarrow \sim P$	z
y	$\sim Q$	0	

این موضوع نشان می‌دهد که قاعده عکس نقیض در KR معتبر است. توجه شود که در اینجا، از شرط تقارن استفاده کرده، و از Rxyz به Rxzy رسیده‌ایم؛ همچنین، با وضع مقدم شرطی در x با مقدم آن در z به صدق تالی در y رسیده‌ایم. ما همواره از شرط تقارن

۶۱ □ KR ربط منطقی برای اعتبار آزمون

به صورت غیرصریح استفاده می‌کنیم؛ از این‌رو، در ادامه، دیگر به موارد کاربرد آن اشاره نخواهیم کرد.

(۵) پخش شرطی

یکی دیگر از قاعده‌های یک‌مقدمه‌ای از دسته سوم، قاعده پخش شرطی است که یکی از صورت‌های چهارگانه آن را در اینجا مورد آزمون قرار می‌دهیم:
 $\therefore P \rightarrow (Q \vee R)$ پخش شرطی

$$\therefore (P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R) \quad (\text{روی فاصل در تالی})$$

ابتدا به جهت «بالا به پایین» این قاعده می‌پردازیم. برای سنجش اعتبار این جهت، باید مقدمه را در یک جهان صادق، و نتیجه را در همان جهان کاذب بگیریم:

x	$P \rightarrow (Q \vee R)$	$(P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R)$
	1	0

بنابراین جدول ارزش فاصل، داریم:

x	$P \rightarrow (Q \vee R)$	$(P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R)$
	1	0 0 0

بنابراین قاعده «آزمون اعتبار»، کذب شرطی $P \rightarrow Q$ در یک جهان غیرنرمال دو جهان جدید مانند y و z پدید می‌آورد که اولًاً $Rxyz$ برقرار است؛ ثانیاً، مقدم آن شرطی در y صادق، و تالی آن در z کاذب است:

x	$P \rightarrow (Q \vee R)$	$(P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R)$	Q	z
	1	0 0 0		
P				
y		1		

اماً $P \rightarrow R$ نیز در x کاذب است و این، دو جهان جدید مانند v و w را پدید می‌آورد:

x	$P \rightarrow (Q \vee R)$	$(P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R)$	R	w
	1	0 0 0		
P				
v		1		

۶۲ □ مرف فلسفی سال نهم، شماره اول، پاییز ۱۳۹۰

از صدق شرطی $P \rightarrow (Q \vee R)$ در x و صدق P در y و v نتیجه می‌شود که $Q \vee R$ در z و w صادق است:

$$\begin{array}{|c|c|} \hline Q \vee R & z \\ \hline 0 & 1 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|c|} \hline Q \vee R & w \\ \hline 1 & 0 \\ \hline \end{array}$$

از ارزش‌های به دست آمده در z و w می‌توان نتیجه گرفت که R و Q ، به ترتیب، در z و w صادق هستند:

$$\begin{array}{|c|c|} \hline Q \vee R & z \\ \hline 0 & 1 \\ \hline 1 & 1 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|c|} \hline Q \vee R & w \\ \hline 1 & 1 \\ \hline 0 & \\ \hline \end{array}$$

ارزش‌های متعارض در z و w نشان می‌دهد که این دو جهان نمی‌توانند یکی باشند. می‌بینیم که به تناقض نرسیده‌ایم؛ اما همهٔ ادات و جمله‌نشانه‌ها ارزش نگرفته‌اند. اگر همهٔ جمله‌نشانه‌های بدون ارزش را صادق در نظر بگیریم، تنها ادات بدون ارزش، یعنی ادات فاصل در مقدمه نیز ارزش می‌گیرد و همچنان به تناقض نمی‌رسیم. آیا می‌توانیم بگوییم اکنون استدلال نامعتبر است و یک مدل شش جهانی (پنج جهان نمودار به همراه جهان g) برای آن ارائه کرده‌ایم؟ خیر، زیرا ارائه مدل مشروط به این است که رابطه دسترسی‌پذیری را میان همهٔ این شش جهان، بر اساس شرایط ساختار، محاسبه کرده باشیم؛ اما میان شش جهان 3 رابطه دسترسی قابل تصور است، و ما محاسبه نکرده‌ایم که کدام‌یک از اینها در مدل شش جهانی ما برقرار است و کدام‌یک برقرار نیست. بنابراین، گریزی نیست از اینکه مدل بالا به مدلی کوچک‌تر و عملاً قابل محاسبه فربوکاهیم. اگر x و v را با g این‌همان بگیریم، y و z نیز این‌همان می‌شوند و شش جهان گفته شده به دو جهان g و x فرمومی‌کا هند:

$$M = \langle W, g, R, V \rangle$$

$$W = \{g, x\}$$

$$R = \{ggg, xxx, gxx, xgx, xxg\}$$

V	P	Q	R
g	1	1	0
x	1	0	1

آزمون اعتبار برای منطق ربط KR ۶۳

اکنون، جهت پایین به بالای قاعدة «پخش شرطی» را که در منطق KR معتبر است بررسی می‌کنیم. در یک جهان، مقدمه را صادق، و نتیجه را کاذب می‌گیریم:

$$x \quad \boxed{(P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R) \quad P \rightarrow (Q \vee R)} \\ \begin{matrix} 1 & 0 \end{matrix}$$

بنا به قاعدة آزمون و شرط کذب شرطی و فاصل، داریم:

$$x \quad \boxed{(P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R) \quad P \rightarrow (Q \vee R)} \\ \begin{matrix} 1 & 0 \end{matrix} \quad \boxed{\begin{matrix} Q \vee R \\ 0 \ 0 \ 0 \end{matrix}} \\ \begin{matrix} P \\ 1 \end{matrix} \quad z$$

در اینجا به تناقضی نرسیده‌ایم. آیا می‌توانیم بگوییم استدلال نامعتبر است؟ خیر؛ زیرا تنها وقتی می‌توانیم بگوییم استدلال نامعتبر است که همه ادات‌ها و جمله‌نشانه‌ها در نمودار ارزش معینی گرفته باشند. ادات‌های شرطی مقدمه (یعنی $P \rightarrow Q$ و $P \rightarrow R$) در جهان x هیچ ارزشی نگرفته‌اند؛ بنابراین، نمی‌توانیم بگوییم استدلال نامعتبر است. اما ارزش این دو ادات شرطی در x چیست؟ صدق ترکیب فصلی میان این دو ادات، نشان می‌دهد که دست‌کم، یکی از آن دو صادق است؛ اما کدام؟

ما در اینجا، دو راه داریم: راه اول آن است که این نمودار را یک بار با فرض صدق $P \rightarrow Q$ ، و یک بار با فرض صدق $P \rightarrow R$ پیش ببریم. اگر هر دو فرض ما را به تناقض برسانند، استدلال معتبر است؛ اما اگر دست‌کم یکی از دو فرض ما را به تناقض نرساند، و همه ادات‌ها و جمله‌نشانه‌ها ارزش‌دهی شوند، آن‌گاه استدلال نامعتبر است. این روش بسیار طولانی است و تا حد ممکن باید از آن پرهیز کرد (در برخی مثال‌ها، از این راه گریزی نیست). راه دوم این است که از قاعدة رفع تالی استفاده شود. ما این راه را پی می‌گیریم: از آنجا که رابطه $Rxyz$ را داریم، اگر $P \rightarrow Q$ در x و P در y صادق باشد، باید Q در z صادق باشد؛ اما Q در z صادق نیست. پس، $P \rightarrow Q$ در x صادق نیست. با همین استدلال، می‌توان نشان داد که $P \rightarrow R$ نیز در x صادق نیست. در این صورت، در x به تناقض می‌رسیم:

□ ۶۴ مرفت فلسفی سال نهم، شماره اول، پاییز ۱۳۹۰

	$(P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R)$	$P \rightarrow (Q \vee R)$	
x	0	<u>1</u>	0
y	P		Q \vee R
	1		0 0 0

z

بنابراین، قاعده «پیخش شرطی» در جهت «پایین به بالا» معتبر است.

۶) قاعده جایگشت

اکنون، به مثال‌های دشوارتر می‌پردازیم. قاعده جایگشت از قاعده‌های یک مقدمه‌ای است:

$$\therefore P \rightarrow (Q \rightarrow R)$$

جایگشت

$$\therefore Q \rightarrow (P \rightarrow R)$$

این قاعده سورهای تودرتو دارد که اثبات اعتبار آنها، دستکم به دو رابطه دسترسی

نیازمند است. برای اثبات قاعده جایگشت، مقدمه ونتیجه آن را در یک جهان کاذب می‌گیریم:

	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	$Q \rightarrow (P \rightarrow R)$	
x	1	0	

چون $(P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \rightarrow Q \rightarrow (P \rightarrow R)$ برقرار

است؛ Q در y صادق، و $P \rightarrow R$ در z کاذب است:

	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	$Q \rightarrow (P \rightarrow R)$	
x	1	0	
y		Q	

z

اماً به دلیل آنکه $R \rightarrow P$ در z کاذب است، دو جهان t و u وجود دارند که $Rztu$ برقرار

است و P در t صادق، و R در u کاذب است:

	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	$Q \rightarrow (P \rightarrow R)$	
x	1	0	
y		Q	

	$P \rightarrow R$	
x	0	
y	P	

	R	
x	0	
y	t	

	u	
x	0	
y	t	

z


t

u

۶۵ □ آزمون اعتبار برای منطق ربط KR

دوباره با وضعیتی روبه رو شده ایم که نه به تناقض رسیده ایم و نه همه ادات ها در همه جهان ها ارزش دهی شده اند. البته $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$ در x صادق می باشد و مقدم آن P در t صادق است؛ اما میان x و t ، رابطه دسترس پذیری مشاهده نمی شود تا از آن نتیجه های را به دست آوریم. شاید به نظر برسد که می توان با ارزش دهی به جمله نشانه ها در جهان هایی که ارزش ندارند کار را به پایان رساند و با نیافتن تناقض، حکم به عدم اعتبار قاعدة جایگشت صادر کرد؛ اما چنین حکمی بسیار شتاب زده است، چون تعداد جهان ها بسیار است و ما شرایط ساختار را که شامل انعکاس، تقارن، و تعدی است، در میان این جهان ها، بررسی نکرده ایم. این احتمال هست که با بررسی این شرایط، تناقضی یافت شود. اتفاقاً، چنین است؛ بررسی شرایط ساختار ما را به تناقض می رساند. ما در ادامه، مراحل کار را نشان می دهیم:

در نمودار بالا، دو رابطه دسترسی $Rxyz$ و $Rztu$ مشاهده می شوند. این دو رابطه را به صورت ساده تر: $R(xy)tu$ می توان نوشت. بنا به شرایط جابه جایی و شرکت پذیری (یا تقارن و تعدی)، می توان به رابطه $R(xt)yu$ رسید.^(۲۷) اما این رابطه، بنا به تعریف، برابر است با $\exists w(Rxtw \& Rwyu)$ نمودار این تعریف به شکل زیر است:



اکنون فرمول های ارزش دهی شده در نمودار پیشین رابه جهان های نمودار جدید منتقل می کنیم:

		$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	$Q \rightarrow (P \rightarrow R)$		
		1	0		
				Q	R
x	P	1		1	0
	t			0	1
				u	

□ ۶۶ مرف فلسفی سال نهم، شماره اول، پاییز ۱۳۹۰

از آنجاکه رابطه $Rxtw$ را داریم، و $(P \rightarrow Q) \rightarrow (Q \rightarrow P)$ در x صادق می‌باشد و P در t صادق است، بنابراین $Q \rightarrow R$ در w صادق است:

x	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	$Q \rightarrow (P \rightarrow R)$		$Q \rightarrow R$	w	R	u
	1	0		1			
t	P			Q	y	0	
	1			1			

از آنجاکه رابطه $Rwyu$ را داریم، و $Q \rightarrow R$ در w صادق می‌باشد و Q در y صادق است، بنابراین R در u صادق خواهد شد:

x	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	$Q \rightarrow (P \rightarrow R)$		$Q \rightarrow R$	w	R	u
	1	0		1			
t	P			Q	y	01	
	1			1			


همان طور که می‌بینیم، در جهان u ، به تناقض می‌رسیم؛ بنابراین، جایگشت در منطق KR معتبر است. پیچیدگی این مثال در آن است که در نگاه نخست، تناقضی در نمودارهای نخستین دیده نمی‌شود و باید از رابطه $R(xy)tu$ ، به رابطه $R(xt)yu$ رسید. در اینجا، دو نکته بسیار باریک هست که اگر به آنها توجه شود، این رابطه‌ها آسان‌تر یافته و اثبات می‌شوند:

۱) انتقال میان این دو رابطه، جزء شرایط ساختار نیست؛ باید امکان این انتقال اثبات شود (اثبات اینکه چنین انتقالی امکان‌پذیر است، با نام‌هایی چون «انتقال» و «تعدی»، دشوار می‌نماید؛ اماً با نام‌هایی چون «جایه‌جایی» و «شرکت‌پذیری»، بسیار آسان‌تر است).

۲) از کجا باید می‌دانستیم که لازم است، از رابطه نخست، به رابطه دوم رسید؟ میان جهان‌های x ، y ، t ، و u ، می‌توان رابطه‌های بسیاری تصوّر کرد؛ از کجا باید می‌دانستیم که

۶۷ □ آزمون اعتبار برای منطق ربط KR

این رابطه خاص (ونه دیگر رابطه‌ها) برایمان سودمند است؟ در پاسخ به این پرسش بسیار مهم، باید به نمودار پیش از تغییر نگریست:



رابطه $R(xt)yu$ از این نمودار خوانده می‌شود و شرطی تودرتوی $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ در x صادق است؛ دو مقدم آن (P و Q)، به ترتیب، در y و t صادق هستند و تالی آن (R) در u کاذب است. پیشتر، وقتی مفهوم رابطه چهارموضعی را بیان می‌کردیم، گفتیم که رابطه چهارموضعی مانند $R(xt)yu$ به این معناست که اگر یک شرطی تودرتو در جهان اول آن صادق باشد و دو مقدم آن در دو جهان بعدی صادق باشند، آنگاه تالی تالی آن شرطی در جهان چهارم صادق خواهد بود. در نمودار بالا، می‌بینیم که شرطی تودرتوی $(P \rightarrow (Q \rightarrow R))$ در x صادق است و دو مقدم آن (P و Q)، به ترتیب، در y و t (ونه در t و y) صادق هستند. اکنون، اگر رابطه چهارموضعی $R(xt)yu$ را داشته باشیم، باید نتیجه بگیریم که R در u صادق است. این امر نشان می‌دهد که اگر بتوانیم رابطه $R(xt)yu$ را اثبات کنیم، می‌توانیم به تناقض برسیم. با این شگرد، در بسیاری از موارد، می‌توان حدس زد که چه رابطه‌هایی می‌تواند ما را به تناقض برساند.

نتیجه‌گیری

آزمونی که در این مقاله برای اعتبارسنجی در منطق KR ارائه کردیم، با اصلاحاتی، برگرفته از آزمون اعتباری است که هیوز و کرسوی در سال ۱۹۹۶ به دست داده بودند. مقایسه‌ای میان این دو «آزمون اعتبار» نشان می‌دهد که به رغم همه تلاش‌هایی که با هدف ساده‌سازی آزمون اعتبار برای منطق KR انجام داده‌ایم، این آزمون بسیار دشوارتر

از آزمون مشابه برای منطق موجّهات است. از آنجاکه سماتیک منطق ربط R (منطقی که استنتاج گزاره‌های دلخواه از تناقض را ممنوع می‌داند) پیچیده‌تر از سماتیک منطق KR است، می‌توان نشان داد که منطق ربط R آزمون اعتبار دشوارتری دارد.

از اینجا، می‌توان پی برد که اگر شرطی لزومی از منطق سینمی را بخواهیم با «استلزم ربطی» به جای «استلزم اکید» تحلیل کنیم، با نظام‌های بسیار پیچیده و دشواری رویه رو می‌شویم که تعیین اعتبار و عدم اعتبار استدلال‌ها در این نظام‌ها به مراتب پیچیده‌تر و دشوارتر است. از آنجا که «استلزم اکید» گزینهٔ مناسبی برای تحلیل «شرطی لزومی» نیست و پارادوکس‌های بسیاری در تحلیل «شرطی لزومی» می‌آفربند، نتیجهٔ می‌گیریم که یک نظام کامل و بی‌عیب و نقص برای «شرطی لزومی» نظامی بسیار پیچیده و دشوار است و این هزینه‌ای است که باید برای استفاده از توانمندی‌های فوق العادهٔ شرطی لزومی پرداخت.

پی‌نوشت‌ها

۱- درباره شرطی‌های لزومی و اتفاقی و تحلیل آنها در منطق جدید، می‌توان به مقالات زیر مراجعه کرد: اسدالله فلاحتی، «شرطی لزومی در منطق جدید»، *تأمّلات فلسفی*، ش ۱، ص ۴۶۷؛ همو، «شرطی اتفاقی در منطق جدید»، *پژوهش‌های فلسفی*، ش ۲۱۴، ص ۱۰۵-۱۳۳.

۲- بحث فلسفی از انواع شرطی در منطق جدید در پیشتر آثار فلسفه منطق آمده است؛ برای نمونه، ر.ک: سوزان هاک، *فلسفه منطق*، ترجمه سید محمدعلی حجتی.

۳- برای نمونه، بحث‌های دشوار ارائه شده، ر.ک: اسدالله فلاحتی، «سلب لزوم و لزوم سلب در شرطی سالیه کلیه»، *معرفت فلسفی*، ش ۲۵، ص ۲۳۳-۲۶۰؛ همو، «لزومی حقیقی و لزومی لفظی»؛ *فلسفه و کلام اسلامی*، ص ۱۰۷-۱۲۹.

4. Relevance Logic.

5. Relevant Logic

۶- برای آشنایی با منطق ربط، ر.ک: استیون رید، *فلسفه منطق ربط*، ترجمه اسدالله فلاحتی؛ لطف الله نبوی، *مبانی منطق فلسفی*.

۷- این منطق‌ها را می‌توان در آثار زیر یافت: استیون رید، همان؛ اسدالله فلاحتی، *نقض بولی و نقض دمورگان در منطق ربط و منطق کلاسیک*؛

A. R., Anderson & N. Belnap, *Entailment: the Logic of Relevance and Necessity*, v. 1; A. R., Anderson & N. Belnap & M. Dunn, *Entailment: the Logic of Relevance and Necessity*. v. II.

8. Testing for validity.

۹- روش جدول ارزش ویژه منطق گزاره‌های است و برای دیگر منطق‌ها کاربرد ندارد. روش نموداری برای منطق گزاره‌ها در بسیاری از کتاب‌های آموزشی بیان شده است؛ برای کاربرد این روش در منطق مسحول‌ها، می‌توان به (ریچارد جفری، *قلمرو و مرزهای منطق صوری*، ترجمه پرویز پیر، ص ۱۳۱-۱۳۶) مراجعه کرد. گریم پریست روش نموداری را به منطق‌های ربط توسعه داده است:

Graham Priest, *A Introduction to Non-Classical Logic*, p. 184-192.

تعریف صورت نرمال در برخی آثار ترجمه شده به فارسی آمده است (هربرت. بی. اندرتون، آشنایی با منطق ریاضی، ترجمه غلامرضا برادران خسروشاهی و محمد رجی طرخوارانی، ص ۱۶۸-۱۶۸)؛ اما آزمون اعتبار به روش صورت برهان رانگارنده تنها در اثری از هیوزوماکس کرسویل، آن‌هم برای منطق موجهات دیده است:

Hughes & Cresswell, *A New Introduction to Modal Logic*, p. 103-105.

10. Truth-Table Method.

11. Tableaux Method.

12. Normal Form Method.

13. Valuation Method.

۱۴- لطف الله نبوی، *مبانی منطق جدید*، ص ۶۱-۶۲.

15. Hughes and Cresswell, Op.Cit, p. 72-92.

۱۶- اسدالله فلاحتی، *منطق موجه*، ص ۸۸-۱۰۸.

۱۷- لطف الله نبوی، *مبانی منطق فلسفی*، ص ۱۴۸ و ۱۵۲-۱۵۳.

□ معرف فلسفی سال نهم، شماره اول، پاییز ۱۳۹۰

۱۸- استیون رید، همان، ص ۳۵۵-۳۵۷ و ۳۸۰-۳۸۱.

۱۹- همان، ص ۳۷۶-۳۷۸، ۱۱۵-۱۱۱.

20. Graham Priest & Richard Sylvan, "Simplified Semantics for Basic Relevant Logics", *Jurnal of Philosophical Logic*, v. 21, p. 217-232.

۲۱- شرط صدق «استلزم ربطی» در جهان‌های غیرنرمال نیز، نسبتاً شبیه شرط صدق «استلزم اکید» در جهان‌های منطق S4 است؛ تنها تفاوت آن است که به جای اینکه مقدم و تالی شرطی در یک جهان مشترک (در دسترس w) بررسی شوند، در دو جهان جداگانه x و y (در دسترس w) بررسی می‌شوند.

۲۲- برای درک دلیل نامگذاری شرط «تعدی» می‌گوییم: اگر جهت چب به راست تعریف «تعدی» را بنویسیم و با قواعد منطق محمول‌ها هم‌ارزهای آن را به دست آوریم، بهتر می‌توانیم مفهوم «تعدی» را در آن درک کنیم:

$$R(ab)cd = Ra(bc)d$$

$$\exists x(Rabx \& Rxcd) \supset \exists x(Rbcx \& Raxd)$$

$$\exists y(Raby \& Rycd) \supset \exists x(Rbcw \& Rawd)$$

$$\forall y[(Raby \& Rycd) \supset \exists w(Rbcw \& Rawd)]$$

$$\forall x\forall y\forall z[(Raxy \& Ryzd) \supset \exists w(Rxzw \& Rawd)]$$

می‌بینیم که با کمی آسان‌گیری، می‌توان گفت که فرمول اخیر می‌گوید: اگر جهان x به جهان y و جهان z دسترسی داشته باشد، جهان x به جهان z دسترسی دارد و این همان تعدی است که در سماتیک منطق‌های

وجهی با آن آشنا شدیم. (همچنین، با آسان‌گیری بیشتر، می‌توان گفت که فرمول اخیر می‌گوید: اگر a به y و y

به d دسترسی داشته باشد، a به d دسترسی دارد.)

۲۲- رابطه «دسترسی» و «دیدن» میان جهان‌ها استعاره‌ای زیباست: انسان از طریق تلویزیون و امواج رادیویی، به دیگر نقاط جهان دسترسی می‌یابد و از طریق دوربین و تلسکوپ، دوردست‌ها و ستاره‌ها را می‌بیند. اما این استعاره زیبا، چنان‌که کریپکی هشدار داده است، می‌تواند بسیار گمراه‌کننده باشد. رابطه «دسترسی» و «دیدن»، دقیقاً به همان معنایی که در متن می‌گوییم، باید فهمیده شود.

24. Hughes and Cresswell, Op.Cit, p. 72-93.

۲۵- لطف الله نبوی، مبانی منطق جدید، ص ۶۱.

۲۶- برای شرح بیشتر این روش، و گشودن گرهایی که گاه در یافتن ارزش برخی فرمول‌ها (مانند ترکیب شرطی صادق، ترکیب فعلی صادق، ترکیب عطفی کاذب و نیز دوشرطی) به وجود می‌آید، ر.ک: اسدالله فلاحت، منطق موجه، ص ۹۴-۹۹؛ Hughes & Cresswell, Op.Cit, p. 80-85.

۲۷- برای رسیدن به رابطه $R(xt)yu$ ، می‌توان برهان زیر را آورد:

1 $Rxyz \& Rztu$	مقدمه
2 $\exists z(Rxyz \& Rztu)$	(۱) \exists
3 $R(xy)tu$	تعريف R (۲)
4 $R(yt)u$	تعدی (۳)
5 $R(xy)u$	تقارن (۴)
6 $R(xt)yu$	تعدی (۵)

منابع.....

- اندرتون، هربرت بی، آشنایی با منطق ریاضی، ترجمه غلامرضا برادران خسروشاهی و محمد رجبی طرخوارانی، تهران، نشر دانشگاهی، ۱۳۶۶.
- جفری، ریچارد، قلمرو و مزهای منطق صوری، ترجمه پرویز پیر، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۶۶.
- رید، استیون، فلسفه منطق ربط، ترجمه اسدالله فلاحتی، قم، دانشگاه مفید، ۱۳۸۵.
- فلاحتی، اسدالله، «شرطی لزومی در منطق جدید»، *تأملات فلسفی*، ش، ۱، بهار ۱۳۸۸، ص ۴۶-۷.
- —، «سلب لزوم و لزوم سلب در شرطی سالیه کلیه»، *معرفت فلسفی*، ش، ۲۵، پاییز ۱۳۸۸، ص ۲۳۳-۲۶۰.
- —، «شرطی اتفاقی در منطق جدید»، *پژوهش‌های فلسفی*، ش، ۲۱۴، پاییز و زمستان ۱۳۸۸، ص ۱۰۵-۱۳۳.
- —، «لزومی حقیقی و لزومی لفظی»، *فلسفه و کلام اسلامی (مقالات و بررسیها)*، دفتر ۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۸، ص ۱۰۷-۱۲۹.
- —، *نقض بولی و نقض دمورگان در منطق ربط و منطق کلاسیک*، رساله دکتری، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۶.
- —، *منطق موجّه*، پایان نامه کارشناسی ارشد، قم، دانشگاه مفید، ۱۳۸۰.
- نبوی، لطف‌الله، *مبانی منطق جدید*، تهران، سمت، ۱۳۷۷.
- —، *منطق ربط*، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۹.
- هاک، سوزان، *فلسفه منطق*، ترجمه سید محمدعلی حجتی، قم، کتاب طه، ۱۳۸۲.
- Anderson, A. R., & N. Belnap & M. Dunn, *Entailment: the Logic of Relevance and Necessity*, Princeton, Princeton University Press, 1975, v. I.
- Anderson, A. R., & N. Belnap, *Entailment: the Logic of Relevance and Necessity*, Princeton, Princeton University Press, 1992, v. II.
- Hughes, E. G. & M. Cresswell, *A New Introduction to Modal Logic*, London, Routledge, 1975.
- Priest, Graham, & Sylvan, Richard, "Simplified Semantics for Basic Relevant Logics", *Jurnal of Philosophical Logic*, v. 21, 1992, p. 217-232.
- ———, *Introduction to Non-Classical Logic*, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.
- Read, Stephen, *Relevant Logic*, Oxford, Basil Blackwell, 1988.